



* 2 2 0 4 D 0 1 *

2022年4月初版

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：パープルショット

第3類医薬品

口腔咽喉薬

パープルショット

Purple Shot

タバコによる喉の痛みに
カラオケ後の声がれに
プールの後の不快感に

特長

- ・有効成分「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物」がのどの炎症部に直接作用して、のどの痛みやはれの原因である炎症を抑えます。
- ・メントールを配合していますので、口の中がスッキリします。
- ・長いノズルでのどの炎症部に確実に薬剤が届きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 口内のただれがひどい人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|----------------|
| 皮ふ又は口腔 | 発疹・発赤、かゆみ又は刺激感 |

- (1) 症状が悪化した場合。


3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【用法・用量】 1日数回適量を患部に噴射塗布してください。


〈使用方法〉

①容器のフタをはずしてください。




②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4~5回押してください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

※薬液がノズルの先端にたまつた時は、液だれを防ぐため、清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
- (3)塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【成分及び分量】(本剤1mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン) 0.2mg

※添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、l-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)薬液が衣服等に付着すると着色します。なお、付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。
- (5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。
- (6)火気に近づけないでください。
- (7)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (8)本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

【お問い合わせ先】

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588

受付時間 9:00~17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

製造販売元 ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

開封日記入欄

| | | |
|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 |
|---|---|---|

使用方法

- 容器のフタをはさしてください。
- 「アーチ」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。
※最初は薬液が出るまで4~5回押してください。
- ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。
- 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

抗炎症成分配合
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

パープルショット
30mL 第3類医薬品

SHIROGANE

のどの炎症によるつらいのどの痛み・口内炎に

のどスプレー

パープルショット
30mL 第3類医薬品

**第3類医薬品
パープルショット**
のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎
成分・分量 (本剤1mL中)
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.2mg
添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、ラバベン、メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わった場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てくくなることがあります。(6)火気とに近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元:白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL:0744-21-5588 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
製造販売元:ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

開封口

販売名:パープルショット
ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 口内のたれがひどい人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|----------------|
| 皮ふ又は口腔 | 発疹・発赤・かゆみ又は刺激感 |

 - 症状が悪化した場合。
 - 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

用法・用量に関連する注意

- 定めた用法・用量を守ってください。
- 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
- 塗布にのみ使い、内服しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

2308A06

製造番号
4 935583 204599

使用期限