

炎症によるのどの 痛み・ハレに

A 浅田 館



炎症によるのどの 痛み・ハレに

AZプラスCPCのどスプレー

抗炎症成分
水溶性アズレン

殺菌成分
CPC



30mL
第3類医薬品

〔使用方法〕



- ① 容器のフタをはずしてください。
※最初は薬液が出るまで4～5回押ししてください。



- ② 「アー」と声を出しながら頰部を押して、適量を患部に噴射塗布してください。
※薬液がノズルの先端にたまったり、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



- ③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。
絶対におやめください。

副作用救済制度 0120-149-931

紙箱 外装フィルム

内容量:30mL



2018年10月第2版

製造番号
使用期限

A2

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどのハレ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【成分・分量】1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）……0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物（CPC）……3mg
添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、トメントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。
- 火気に近いにつけないでください。
- 本剤使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので運転中のご使用はお控えください。

発売元 **A 浅田 館**
東京東区山手区大塚1丁目5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044
時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **ダイア製薬株式会社**
奈良県橿原市上島寺町515

AZプラスCPCのどスプレー

この箱はお薬とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

△ ご使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。〕
長期連用しないでください。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 口内にひどいただれのある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

- 使用后、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口の刺激感
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合には使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】

- 1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
●定められた用法、用量を厳守してください。
●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
●のどや口内への塗布用のみ使用してください。
●目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

第3類医薬品

口腔咽喉薬