

第3類医薬品

# のどの痛み 口内炎


アズショットのドスプレー

開封日

## 〔使用方法〕




① 噴霧のフタをはずしてください。



② 「アール」と書かれている部分を押し、患部に薬液を2〜3回照射してください。

※最初は薬液が出るまで4〜5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、吸い取らぬため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対にやめください。

水性アズレン配合

# のどの痛み 口内炎

アズショットのドスプレー



30mL

第3類医薬品

## 【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

## 【容量】

90mL  
【成分・分量】 (本剤1mL中) アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg 添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、ポリヒンクリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、β-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

## 【保存及び取り扱ひ上の注意】

【保存】直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)火気に近いところを避けてください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼吸中に過気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社

T634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL.0744-21-5588

受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社

T634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用情報検索 ☎020-149-931

開封口

第3類医薬品

口腔内消炎剤

販売名：アズショット

ご使用に際して、この説明文書をお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ▲ 使用上の注意

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 口内炎にたれがひどい人。
- (3) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

- (1) 症状が強化した場合。
- (2) 3.5〜6日間使用しても症状がよくなりないう場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】 1日数回量を患部に噴射塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 誤らぬための用法・用量を守ってください。
- (2) 服を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息を吐きながら、2〜3回噴射してください。
- (3) 塗布のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないうよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

紙 箱 プラ 外装フィルム：PP



4 935583 204414

2019年2月改訂第2版



4 935583 204414

製造番号

使用期限