

Hapicom

30mL

アズリースロート

第3類医薬品

のどの炎症による  
のどのはれ

1日数回適量を患部に噴射塗布

製造年月日  
年 月 日

## 使用方法



① 容器のフタをはずしてください。



② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回噴射してください。

※ 最初は液が出るまで4〜5回押ししてください。

※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくはたり、折れた針は危険です。絶対にやめください。



MADE IN JAPAN



2019年11月改訂第5版

Hapicom

のどスプレー

のどの炎症による

のどのはれ

痛み 口内炎

アズリースロート



水溶性アズレン

消炎成分

内容量 30mL

第3類医薬品

製造番号

使用期限

口咽咽喉薬 Throat Spray

第3類医薬品

アズリースロート

のどの炎症によるのどのはれ・のどの痛み・声がれ、口内炎のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)

アズレンルホネンナリウム水合物 (水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水、アム、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、β-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えてください。(4) 品質の原因になったり品質が変わる場合があります。(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落とすしてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てくなくなる場合があります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼吸器に湿気等ひびきと判定される濃度以上のアルゴール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元:白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上座町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日も除く)

製造販売元:ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上座町515

副作用情報 0120-149-931

紙箱 外袋フィルム:PP

開封口

第3類

医薬品

販売名:アズリースロート

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に認めるように大切に保管してください。

## △ 使用上の注意

## ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 口内のただれがひどい人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症状
皮膚又は口腔	発疹、発赤、かゆみ又は刺激感

## (1) 症状が悪化した場合。

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

## (用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用する。薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、短く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
- (3) 塗布のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水で洗い流す。また、目に入った場合は、直ちに眼科医の診療を受けてください。