

A2406



副作用数減少制度  
0120-149-931

下段は使用期間中で  
上段は製造番号です。



5g



# 口内炎治療薬

軟膏917 しかり付着し患部を保護！  
抗炎症成分 トリアムシノンアセット配合

## 口内炎

つらい痛みにも効く

頬の内側 舌 唇の裏側

# 口内炎

つらい痛みにも効く

頬の内側 舌 唇の裏側



軟膏917  
すっきり付着

殺菌防腐剤配合

第②類医薬品  
A8 口内炎治療薬  
パンキー口内炎軟膏

### 第②類医薬品

## パンキー口内炎軟膏

【効能・効果】 口内炎（アフタ性）

口内炎（アフタ性）とは…頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が深くぼんぼんた白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍（直径10mm未満）が1～数個でさた炎症の総称です。

#### 【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)本剤は口腔用のみ使用し、口腔用以外には使用しないでください。(4)入れ歯の接着など治療以外の目的に使用しないでください。(5)塗布後はしばらく飲食を避けてください。(6)痛みが治まったら使用を終了してください。

#### 【成分・分量(100g中)】

トリアムシノンアセット0.1g  
添加物：流動パラフィン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビニルポリマー、キシリトール、サッカリンナトリウム水和物、香料、ゲル化炭化水素

#### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)

製造販売元

万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社  
「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00～17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

MADE IN JAPAN

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際して、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

#### △ 使用上の注意

※してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人には使用しないでください  
(1)感染性の口内炎が疑われる人。(医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください)  
・ガーゼなどで擦ると容易に割がすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人。(カンジダ感染症が疑われます)  
・患部に黄色い膿がある人(細菌感染症が疑われます)  
・口腔内に米粒大～小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人。(ウイルス感染症が疑われます)  
・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人。(ウイルス感染症が疑われます)  
(2)口腔内に感染を伴っている人。(ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの疑いがあることから、細菌感染、歯内炎等の口腔内感染がある部位には使用しないでください)  
(3)5日間使用しても症状の改善がみられない人。  
(4)1～2日間使用して症状の悪化がみられる人。

#### ■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)授乳中の人。(5)患部が広範囲にある人。(6)高齢者。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
口腔内	白斑(カンジダ感染症が疑われる)、 患部に黄色い膿がある(細菌感染症が疑われる)
その他	アレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、気管支喘息発作、浮腫等)

- 3.本剤使用後、次の症状があらわれた場合には、感染症による口内炎や他疾患による口内炎が疑われるので使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹、水疱(口腔内以外)、発疹・発赤、かゆみ、口腔内の患部が広範囲に広がる、白の痛み、かすみ目、外陰部腫瘍

第②類医薬品  
口内炎  
パンキー口内炎軟膏

第②類医薬品  
口内炎  
パンキー口内炎軟膏