

第2類医薬品

神経質な方の漢方胃腸薬
三九漢方胃腸薬

使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

胃のもたれ、食欲不振、胸やけ

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	$\frac{2}{3}$ 包	
4才以上7才未満	$\frac{1}{2}$ 包	
2才以上4才未満	$\frac{1}{3}$ 包	
2才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

＜用法・用量に関連する注意＞

- 2才以上の幼児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

〔成分・分量〕1日量3包(1包1.5g)中

ケイヒ末……………	842.1mg	エンゴサク末……………	631.6mg
ボレイ末……………	631.6mg	ウイキョウ末……………	315.8mg
シユクシャ末……………	210.5mg	カンゾウ末……………	210.5mg
リョウキョウ末……………	105.3mg	ブクリョウ末……………	1,052.6mg

添加物：乳糖、無水ケイ酸を含有

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは、配置員の方または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号：076-472-1011

受付時間：9：00～16：30(土、日、祝日を除く)