

第2類医薬品

漢方製剤

かぜ

のひきはじめに

葛根湯エキス顆粒

眠くなりにくい漢方のかぜ薬

体力中等度以上の方に

鼻かぜ

肩こり

頭痛



薬

(1包1377mg)

服用前に箱側面の説明書を必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒WS-R

【効能効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上)……………1回 1 包
7才以上15才未満……………1回 2/3包
4才以上 7 才未満……………1回 1/2包
2才以上 4 才未満……………1回 1/3包
2才未満……………1回 1/4包
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。●食間とは食後2～3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

【成分分量】

3包(成人1日量)中
葛根湯エキス(4/5量)…………… 3483mg
〔カクコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、
ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、
ショウキョウ0.81g〕

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

⚠️【使用上の注意】

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないで下さい
生後3カ月未満の乳児

👤 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)むくみ、排尿困難の症状のある人(9)高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

製造販売元

 **滋賀県製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町瀬879

葛根湯エキス顆粒

漢方製剤

第2類医薬品

30包
(1包1377mg)



第2類医薬品

葛根・麻黄・大棗・桂皮・芍薬・甘草

鼻かぜ、肩こり、頭痛

かぜの
ひきはじめに

体力中等度以上の方の



30包
(1包1377mg)

漢方製剤

葛根湯エキス顆粒

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀郡湯979



服用前に箱側面の説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒WS-R

【効能効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上).....1回 1包
7才以上15才未満.....1回 2/3包
4才以上7才未満.....1回 1/2包
2才以上4才未満.....1回 1/3包
2才未満.....1回 1/4包
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

＜用法用量に関連する注意＞

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させて下さい。

【成分分量】

3包(成人1日量)中
葛根湯エキス(4/5量)..... 3483mg
〔カクコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、
ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、
ショウキョウ0.81g〕

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

13JUL15.5

葛根湯エキス顆粒

漢方製剤

かぜのひきはじめに

体力中等度以上の方の

鼻かぜ、肩こり、頭痛

葛根・麻黄・大棗・桂皮

芍薬・甘草



第2類医薬品 30包(1包1377mg)

【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないで下さい
生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)むくみ、排尿困難の症状のある人(9)高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい