

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

# 葛根湯エキスG

顆粒

第2類医薬品

## 〔葛根湯エキスGの特徴〕

本剤は漢方の原典である傷寒論に記載されている葛根湯を基に、その抽出物を使用しやすい顆粒剤に製したもので、大人・小児の別なく服用出来ます。

葛根湯は7種類の生薬の複合作用により風邪のひき初めで、悪寒、発熱、頭痛などを伴うものや筋肉痛、肩こりなどに効果を発揮します。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
生後3ヵ月未満の乳児。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。  
(4)胃腸の弱い人。  
(5)発汗傾向の著しい人。  
(6)高齢者。  
(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(8)次の症状のある人。 むくみ、排尿困難  
(9)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

## 〔効能・効果〕

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり。

## 〔用法・用量〕

次の量を、食間又は空腹時に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 〔成分・分量〕

1日量（3包）中

（1包 2.0g）

成分・分量	はたらき								
葛根湯エキス（4/5量）……………4.0g	かぜの初期の発熱、 悪寒、頭痛、関節痛、 首筋から肩にかけて のこりや痛みを抑え ます。								
<table border="0"> <tr> <td>カッコン ……………6.4g</td> <td rowspan="7">から製した水製乾燥 エキスで、本品1g は原生薬5gに相当 します。</td> </tr> <tr> <td>マオウ ……………3.2g</td> </tr> <tr> <td>タイソウ ……………3.2g</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ ……………2.4g</td> </tr> <tr> <td>シャクヤク ……………2.4g</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ ……………1.6g</td> </tr> <tr> <td>ショウキョウ ……………0.8g</td> </tr> </table>		カッコン ……………6.4g	から製した水製乾燥 エキスで、本品1g は原生薬5gに相当 します。	マオウ ……………3.2g	タイソウ ……………3.2g	ケイヒ ……………2.4g	シャクヤク ……………2.4g	カンゾウ ……………1.6g	ショウキョウ ……………0.8g
カッコン ……………6.4g		から製した水製乾燥 エキスで、本品1g は原生薬5gに相当 します。							
マオウ ……………3.2g									
タイソウ ……………3.2g									
ケイヒ ……………2.4g									
シャクヤク ……………2.4g									
カンゾウ ……………1.6g									
ショウキョウ ……………0.8g									

添加物：乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
 東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10  
 電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA** 東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10