

**使用上の注意**

■ **相談すること**  
 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の指導を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

使用期限

製造番号

# かぜの初期症状に



## 内服液 トピック葛根湯内服液

漢方製剤

第2類医薬品 30mL

製造販売元

日新薬品工業株式会社  
 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1  
 お問い合わせ先 ☎0120-415-688  
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や足の痛み

**【用法・用量】**

次の量を、食間によく振ってから服用してください。(食間とは「食事と食事の間」のことを指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください。	

**<用法・用量に関連する注意>**

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。  
 (2) 本剤は1回1本飲みきりです。  
 (3) 生薬抽出剤のため、本剤は本質的に沈殿を含みます。服用前によく振ってから服用してください。

**【成分・分量】**1日の服用量90mL(30mL×3本)中  
 葛根湯エキス7.1g(日局カクコン0.0g、日局マオウ4.0g、日局タイソウ4.0g、日局ケイヒ3.0g、日局シャクヤク3.0g、日局カンゾウ2.0g、日局ショウキョウ1.0gより抽出)  
 添加物:精製白糖、ブドウ糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ安息香酸ブチル、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因になったり、品質が変わります。)  
 (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。  
 (5) ビンを開けたら飲みきってください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931	ガラス・ビン 金属・キャップ
----------------------------	-------------------