

— ⚠ 使用上の注意 —

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果** かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

**用法・用量** 次の量を1日3回食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15歳以上)	1 本	3 回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。

押してあける

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

**成分・分量** 3本(90mL)(大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タインソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンソウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g


添加物として白糖、D-ソルビール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸(Na、パラベン、香料(ℓ-メントール))を含有します。


**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤には生薬エキスが配合されているため、沈殿を生じることがあります。このような場合にはよく振ってから服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

**副作用被害救済制度**

☎ 0120-149-931

発売元  **カシマ薬品商事株式会社**  
佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12

製造販売元  **大生堂薬品工業株式会社**  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

お客様相談室 058-271-9481  
(9:00~17:00 土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号

発熱  
鼻づまり  
のどの痛み  
頭痛  
さむけ

葛

根

湯

かっこんとう



第2類医薬品

30mL×6本入