

第2類医薬品

開け口

販売名:パオニン葛根湯内服液

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量

次の量を1日3回食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。
本剤は1回1本の服用で飲みきります。

成分・分量

3本(90mL)[大人1日服用量]中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g


添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。
- (5) 使用期限(外箱及びビンラベル)のすぎた製品は服用しないでください。

企画元:

株式会社ツルハグループアーマーチャンタイシヨウケ

製造販売元  大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

お客様相談室 大生堂薬品工業株式会社 058-271-9481

(9:00～17:00 土、日、祝日を除く)



箱

ガラス:ビン
金属:キヤノン

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

4



5711292 678100

使用期限

製造番号



くらしずム
MEDICAL
by TSURUHA GROUP

かぜのひきはじめに

パオニン 葛根湯 内服液

PAONIN KAKKON-TO ORAL LIQUID

- 発熱
- さむけ
- 頭痛
- 鼻水
- のどの痛み

満量処方

眠くなる
成分は入って
いません

第2類医薬品

30mL

第2類医薬品

1日分 30mL×3本