



4 982178 136636

使用期限

製造番号

ガラス：瓶  
金属：キャップ

# カゼの初期症状に 葛根湯内服液S

ここからあける

第2類医薬品

30mL×3本

## △使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚部な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の強い人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
痛アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 〈効能・効果〉

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

### 〈用法・用量〉

成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間によく振ってから服用する。

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)小児に服用させないこと。

### 〈成分・分量〉

1日量90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8.3g

カクコン	8g	ジャクヤク	3g
マオウ	4g	カンゾウ	2g
タイソウ	4g	ショウキョウ	1g
ケイヒ	3g	より得た軟工ス	

添加物としてブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化(ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

製造販売元

萬金薬品工業株式会社

奈良県高市郡明日香村野口317

お客様相談室 TEL:0744-54-2012  
AM8:30～PM5:00 土、日、祝日を除く副作用被害救済制度の問合せ先  
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)