

服用前に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

〈漢方製剤〉

満量処方

かつ こん とう
イトーの葛根湯エキス錠

- ・かぜのひきはじめに。(体がゾクゾクし、寒気が取れないような状態)
- ・頭痛、肩こりなどの症状に。

！ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、

薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面につづきます



効能

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

※食間とは？…食後2～3時間後のことです。

1日3回 食前又は食間※ (水又は白湯) で服用)	1回量		
	大人 (15才～)	7才～14才	7才未満
	3錠 	2錠 	服用しない

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

満量処方とは？…漢方処方より得られたエキス
を全量配合していることを意味します。

1日量(9錠)中 葛根湯エキス 2550mg
カッコン 4g ケイヒ 2g ショウキョウ 1g
マオウ 3g シャクヤク 2g
タイソウ 3g カンソウ 2g

上記生薬より抽出

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロースを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. めれた手で触れないでください。
(湿気により変色する場合があります。)
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



妊娠中



7歳未満



×：服用しない

△：医師、薬剤師または登録販売者に相談

※その他ご注意は、本書(表面)をご覧ください。

お客様相談室



06-6743-3033 10:00～17:00(土日祝を除く)

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1