

第2類医薬品

販売名:カンボーエース
葛根湯内服液2

開け口

ご使用に際して、外箱の
説明文を必ずお読みくだ
さい。また、必要な時に読
めるよう商品と共に大切に
保管してください。

△ 使用上の注意

※ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又
は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱
な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい
人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発
疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある
人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、
腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルド ステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感 やこばりに加え、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮 膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振 等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する
場合には5~6回)服用しても症状がよくなら
ない場合は服用を中止し、この外箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登
録販売者に相談すること

■ 用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから
服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1本 (45mL)	1日2回
15才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~
3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は
1回1本飲みきりです。(3) 本剤は本質的に沈
殿を含んでいますので、よく振ってから服用し
てください。

■ 効 能

体液中程度以上のものの次の諸症:感冒の初
期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭
痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

■ 成分・分量 1日量 90mL(45mL×2本)中
葛根湯エキス……………4.34g
(カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、
シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物:キシリトール、スクラロース、D-ソル
ビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和
物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビ
ニルアルコール(部分けん化物)、安息香酸
Na、パラベン、アルコール、香料

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



眠くなる成分を含まない

朝夕 45mL×2本(1日分)
1日2回でしっかり効く

葛根湯内服液

満量
処方

カンボーエース
葛根湯内服液2

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保
管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して
ください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください
(誤用の原因になったり品質が変わり
ます。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しな
いください。
- (5) 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着
しますので、瓶を横にして保管しな
いください。

販売元

サンドラッググループ

製造販売元

新日製薬株式会社
岐阜県岐阜市長良法久寺町16番地

新日製薬株式会社 お客様相談室
電話:0120-723-211
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)