

◀開封口

開封口▶



第2類医薬品

漢方煎専科

桂枝加苓朮附湯

18

5日分15包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

漢方薬 桂枝加苓朮附湯「タキザワ」

21K

△<使用上の注意>



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他の | 動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------------------------|---|
| 偽アルドス テロン症、 ミオバチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 【成分・分量】 | |
|-----------------|-------|
| ケイヒ | 4.0g |
| カンゾウ | 2.0g |
| シャクヤク | 4.0g |
| ソウジュツ | 4.0g |
| タイソウ | 4.0g |
| ブクリヨウ | 4.0g |
| ショウキョウ | 1.0g |
| ブシ | 0.5g |
| 1日分 (1包7.83g×3) | 23.5g |

【効能・効果】

体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛

【用法・用量】

1日3回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約200mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

| 年 齢 | 1回量 |
|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 全量 |
| 15歳未満 7歳以上 | 成人の2/3 |
| 7歳未満 4歳以上 | 成人の1/2 |
| 4歳未満 2歳以上 | 成人の1/3 |
| 2歳未満 | 成人の1/4 |

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180667

製造販売元



株式会社 タキザワ漢方
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室☎048-688-7923
受付時間: 9時~18時(月~金) ホームページ:takizawa.asia

タキザワ漢方

検索

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931

