

25



私の漢方薬

第2類医薬品

180錠
30日分

NHA

株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ

- ✓ 月経痛
- ✓ 肩こり
- ✓ 更年期障害

桂枝茯苓丸エキス錠
「けいしぶくりょうがん」



私の漢方薬



吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしっかりとしめること
服用に際して、この説明文を必ずお読みください

第2類医薬品

販売名：桂枝茯苓丸料錠 T25

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること：下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^注、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

注 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです

用法・用量 次の量を1日2回食前または食間に、水または白湯にて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回
7歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上7歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2~3時間を指します
<用法および用量に関連する注意>
1. 用法・用量を厳守すること
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(6錠)中 桂枝茯苓丸エキス(1/2量)1150mg(ケイヒ 2.0g、ブクリョウ 2.0g、ボタンビ 2.0g、トウニン 2.0g、シャクヤク 2.0g より抽出)を含む

添加物として、CMC-Ca、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含む

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にぬれた手で触れないこと (6) 手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがあります (8) 乾燥剤は服用しないこと

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 ☎ 0120-149-931

発売元 株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ
東京都豊島区西池袋3-27-12
お問い合わせ先：0120-009-642
受付時間：9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)



製造番号
SE-1
使用期限

製造 中村薬品工業株式会社
販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32