

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## ホリエの桂枝茯苓丸料

ホリエの桂枝茯苓丸料は、漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異のにおいがある。  
桂枝茯苓丸料は、のぼせ症で下眼瞼が充血し、血色はよく、頭痛、肩こり、めまいなどがあって、冷えを伴い、下腹部に圧痛を認めるものに適している。

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### その他の注意

服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこし去ること。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないこと。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 本剤は、4歳未満の乳幼児に服用させないこと。

## 【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ

《備考》注）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

## 【用法・用量】

本品1袋を和紙袋入りのまま水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用する。

上記は大人の1日量である。ただし小児は下記の用量を服用する。

15歳未満7歳以上 大人量の2/3

7歳未満4歳以上 大人量の1/2

## 【成分・分量】

本品1袋（1日量）20.0g中

日局ケイヒ 4.0g 日局トウニン 4.0g 日局ブクリョウ 4.0g

日局シャクヤク 4.0g 日局ボタンピ 4.0g

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

お問い合わせ先

堀江生薬株式会社 お客様相談室

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

☎ 06-6231-1890

製造販売元

堀江生薬株式会社

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町367-1