

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

18

錠剤 <sup>ご</sup>五 <sup>しゃく</sup>積 <sup>さん</sup>散

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。  
排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症：

胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

〔用法・用量〕

食前1時間、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	6～8錠	3回

〔成分・分量〕（本剤100錠中）

日局	ソウジュツ末	2.0g	別紙規格	キシツ末	1.1g
日局	ブクリョウ末	2.0g	日局	ケイヒ末	1.1g
日局	ビャクシュツ末	2.0g	日局	カンソウ末	1.1g
日局	トウキ末	2.0g	日局	ショウキョウ末	2.0g
日局	キキョウ末	1.1g	別紙規格	ハンゲ末	2.0g
日局	コウボク末	1.1g	局外生規	チンピ末	2.0g
日局	シャクヤク末	1.1g	局外生規	マオウ末	1.1g
日局	センキュウ末	1.1g	別紙規格	タイソウ末	1.1g
			別紙規格	ビャクシ末	1.1g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は，原料として天然の生薬を用いていますので，製品により多少色が異なったり，開栓後，吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが，効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00（土，日，祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10