

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

レナール

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に「金匱要略」に記載されている五苓散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1カ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ

〈効能・効果に関連する注意〉

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

第2類医薬品

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	4才未満	服用しないこと	
15才未満7才以上	2/3包				
7才未満4才以上	1/2包				

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 本品1日量3包(1包1.5g)中

日本薬局方タクシャ	2.0g	日本薬局方タクシャ末	0.60g
日本薬局方チョレイ	1.5g	日本薬局方チョレイ末	0.45g
日本薬局方ブクryw	1.5g	日本薬局方ブクryw末	0.45g
日本薬局方ビャクジュツ	1.5g	日本薬局方ビャクジュツ末	0.45g
日本薬局方ケイヒ	1.0g	日本薬局方ケイヒ末	0.30g
より製した水製乾燥エキス	1.05g	添加物として、部分アルファー化デンプンを含有する。	

副作用被害救済制度の問合せ先：(独)医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149-931

製造販売元：東洋漢方製薬株式会社
大阪府富田市中野町東2-1-16

発売元：株式会社ハーバルアイ
福岡県福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル6階

漢方生薬研究所 お客様相談室
☎ 0120-852-489
[受付時間：10:00-17:00 平日のみ]