



一歳の子供から大人まで服用できる

のみやすい顆粒タイプ

# 足つった!

筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある  
こむらがえり・  
腹痛・腰痛に

ドルチェ顆粒 (芍薬甘草湯)

ドルチェ顆粒

体力に関わらず  
使用でき、筋肉の急激な  
けいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

持ち運びに便利な **分包品**

第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【販売名】ドルチェ顆粒 **第2類医薬品**

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】

1日2～3回服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日 2～3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中  
日局 芍薬甘草湯エキス 2.4g

成分	分量	成分	分量
日局 シャクヤク	6g	日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
(1) 生後3カ月未満の乳児 (2) 次の診断を受けた人：心臓病
- 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

🗨️ **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 次の症状のある人：むくみ  
(5) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

一歳の子供から大人まで服用できる

のみやすい  
顆粒タイプ

足った!

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565  
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



有効成分  
そのまま!

飲みやすくなりました  
(1包あたり2g→1g)

一歳の子供から大人まで服用できる

のみやすい顆粒タイプ

足った!

こむらがえり・腹痛・腰痛に  
筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある