

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

## 第2類医薬品

じゅうぜんたい ほ とう

# 十全大補湯エキス顆粒KM

漢方製剤 ～病後・術後の体力低下、疲労倦怠、貧血に～ 満量処方

十全大補湯エキス顆粒KMは、体力虚弱で貧血や疲労倦怠がある、あるいは病後、手術後などで体力が弱っているときに効きます。



### 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

## 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7 才 以 上 15 才 未 満	2/3 包	
4 才 以 上 7 才 未 満	1/2 包	
2 才 以 上 4 才 未 満	1/3 包	
2 才 未 満	1/4 包	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

### <用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

## 【成分・分量】

1日量3包（1包3.0g）中

十全大補湯水製乾燥エキス（出典：漢方診療医典）…………… 5.00g

ジオウ…………… 3.5g	ソウジュツ…… 3.5g	トウキ…………… 3.5g
ブクリョウ…… 3.5g	ケイヒ…………… 3.0g	シャクヤク…… 3.0g
センキュウ…… 3.0g	オウギ…………… 2.5g	ニンジン…………… 2.5g
カンゾウ…………… 1.0g		より製した乾燥エキス

添加物：乳糖，ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。  
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55  
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）