

【漢方薬】 252錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

ホノミチンガイン®錠 第2類医薬品

〔成分・分量〕 18錠(3.6g)中  
 (カンキョウ1.50g・カンゾウ1.50g・ケイヒ1.50g・ゴミシ1.50g・サイシン1.50g・シャクヤク1.50g・ハンゲ3.00g・マオウ1.50g)小青竜湯エキス(1/2量)1.800g

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますが、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに

薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位 (感冒に服用する場合には5~6日間) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



第2類医薬品

# KANPO 220

Ingredients  
 Processed Ginger, Glycyrrhiza, Cinnamon Bark, Schisandra Fruit, Asiasarum Root, Peony Root, Pinellia Tuber, Ephedra Herb

Indications  
 Following symptoms in persons with moderate or slightly poor physical strength who suffer from coughing with thin watery phlegm and runny nose: Bronchitis, bronchial asthma, rhinitis, allergic rhinitis, edema, common cold, and hay fever.

Dosage and Administration  
 Please take the following quantity with more than half a glass of lukewarm water between meals.  
 Adults (over 15 years): 6 tablets, 7-14 years: 4 tablets, 5-6 years: 3 tablets 3 times daily.

Size: 252 tablets (14 days)

Made in Japan

〔用法・用量〕 次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服用 回数
成人 (15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>  
 (1) 用法・用量を厳守してください。  
 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕  
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

製造番号

使用期限

〔発売元〕  
 株式会社MORI PHARMACY  
 東京都豊島区北大塚3-25-16  
 伊納ビル2F  
 問合せ先: 0120-541-555  
 (平日10時~19時)  
 (製造販売元) 劑盛堂薬品株式会社  
 和歌山市太田二丁目8番31号

