

# 漢方製剤

販売名:ダスマックa  
Medicine for Cough and Bronchitis

押して開ける

## 第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

### △使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お 製造販売元 小林製薬株式会社  
買い求めのお店又は 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3  
お客様相談室にお願  
いいたします

10212993

MADE IN JAPAN



あつたらいいな／をカタチにする  
発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
小林製薬 お客様相談室  
**0120-5884-01**  
9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

### 効能・効果

体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

### 用法・用量

大人（15才以上）1回1包、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください（15才未満は服用しないこと）

＜用法・用量に関連する注意＞  
定められた用法・用量を厳守すること

● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことといいます

### 成分・分量

1日量(2包:6.0g)中  
清肺湯エキス 3.2g

〔オウゴン 1.0g、キキョウ 1.0g、ソウハウヒ 1.0g、キヨウニン 1.0g、サンシシ 1.0g、テンモンドウ 1.0g、バイモ 1.0g、チンピ 1.0g、タイソウ 1.0g、チクジョ 1.0g、ブクリョウ 1.5g、トウキ 1.5g、バクモンドウ 1.5g、ゴミシ 0.25g、ショウキョウ 0.25g、カンゾウ 0.5g より抽出  
(添加物：デキストリンを含む)

添加物として、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、L-メントール、プロピレングリコール、乳糖を含有する

● 本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

気管支炎は喫煙などで慢性化しやすく、呼吸機能を低下させるおそれがあります。

喫煙を控えるなどして健康管理することが重要です。

### 特徴

● タバコや排気ガスなどで、せき・たんが続く方のお薬です

● 漢方処方「清肺湯（せいはいとう）」が気管支粘膜の汚れを取り除きながら、せき・たんをやわらげます

● 気管支の状態を正常に近づけ、呼吸をラクにしています

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わること）

副作用被害救済制度  
**0120-149-931**