



ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

36

だい おう ぼ たん び とう  
錠剤 大 黄 牡 丹 皮 湯

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 1ヵ月位（便秘、痔疾に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：  
月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾

〔用法・用量〕

食前1時間、又は食間に温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

				自社製別紙規格			
日局	ダイオウ末	1.2 g	日局	ダイオウ	1.3 g	} 別水性 紙工 規準 格ス	} 2.5 g
日局	ポタンピ末	4.7 g	日局	ポタンピ	5.3 g		
日局外	硫酸ナトリウム	4.7 g	日局	トウニン	5.3 g		
日局	トウニン末	4.7 g	日局外	硫酸ナトリウム	5.3 g		
別紙規格	トウガシ末	7.2 g	日局	トウガシ	7.8 g		

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」  
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10  
電話：03-3957-2997  
○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社  
東京都豊島区要町3-4-10