

【漢方薬】 252錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

ホモジツキョウ®錠 第2類医薬品

【成分・分量】 18錠(3.6g)中
(オウゴン1.5g・キジツ1.0g・サイコ3.0g・シャクヤク1.5g・ショウキョウ0.5g・ダイオウ0.5g・タイソウ1.5g・ハンゲ2.0g)大柴胡湯エキス(1/2量)1.460g

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますが、効果に変わりはありません。

【効能・効果】 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

△ 使用上の注意

- ⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

SC LABO

第2類医薬品

KANPO 210

Ingredients
Scutellaria Root, Immature Orange, Bupleurum Root, Peony Root, Ginger, Rhubarb, Jujube, Pinellia Tuber

Indications
Following symptoms in persons with substantial physical strength who suffer from upper abdominal and flank pain and have a tendency to constipation: Gastritis, habitual constipation, stiff shoulder associated with hypertension or obesity, headache, constipation, neurosis, and obesity.

Dosage and Administration
Please take the following quantity with more than half a glass of lukewarm water between meals.
Adults (over 15 years) : 6 tablets, 7-14 years : 4 tablets, 5-6 years : 3 tablets 3 times daily.

Size: 252 tablets (14 days)

Made in Japan

【用法・用量】 次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

製造番号

使用期限

【発売元】
株式会社MORI PHARMACY
東京都豊島区北大塚3-25-16
伊納ビル2F
問合せ先: 0120-541-555
(平日10時~19時)
(製造販売元) 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

