

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ホリエ 腸麗湯（通導散料）

ホリエ 腸麗湯は、漢方処方中の通導散料の処方にしたがって生薬を配合した煎剤で、特異なおいがある。

腸麗湯は、体力中等度以上で、月経不順や月経困難があり、便秘を伴う頭痛、めまい、肩こりのある者に適している。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) むくみのある人。
 - (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------------|
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|---------------------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1カ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

服用に際して、次のことに注意してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこし去ること。
- (3) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないこと。
- (4) 本剤は、小児（15歳未満）に服用させないこと。

【効能・効果】

比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経痛、更年期障害、便秘、打ち身（打撲）、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

【用法・用量】

大人は1袋を1日量とする。1袋に水600mLほど入れ煎じて約半量に煮つめ、煎液を1日2～3回に分けて食前または食間空腹時に温服する。

【成分・分量】

本品1袋（1日量）25.0g中

| | | | | | |
|--------|------|--------|------|-----------|------|
| 日局トウキ | 3.0g | 日局ダイオウ | 3.0g | 日局硫酸ナトリウム | 4.0g |
| 日局キジツ | 3.0g | 日局コウボク | 2.0g | 日局モクツウ | 2.0g |
| 日局コウカ | 2.0g | 日局カンゾウ | 2.0g | 日局チンピ | 2.0g |
| 局方外ソボク | 2.0g | | | | |

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

お問い合わせ先

堀江生薬株式会社 お客様相談室

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

☎ 06-6231-1890

製造販売元

堀江生薬株式会社

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町367-1