

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

# 大正 当帰芍薬散エキス錠

第2類医薬品 〈漢方薬〉

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)胃腸の弱い人。  
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	3錠	1日3回
5才～14才	2錠	
5才未満	服用しないこと	

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします。

### 【注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）
- 乾燥剤は服用しないでください。

### 最初に服用する時に

詰め物を取り出して捨ててください。（この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります）

### 成分

9錠中

当帰芍薬散エキス（1/2量） 2.00g

〔 トウキ…………… 1.5g シャクヤク…………… 2.0g ヒャクジュツ…………… 2.0g 〕  
〔 センキュウ…………… 1.5g プクリョウ…………… 2.0g タクシャ…………… 2.0g 〕より抽出

添加物：部分アルファー化デンプン、クロスCMC-Na、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg

### 【注意】

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。（品質保持のため）

この製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

● 連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

● 電話 03-3985-1800

● 受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元 大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho-direct.jp/>

製造販売元 株式会社ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区柳ヶ池1755番地3

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)