

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】 **ホノミカイケツ<sup>®</sup>EX錠**

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 胃腸の弱い人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中  
(シクヤク2.0g・センキユウ1.5g・タクシャ2.0g・トウキ1.5g・ピャクジュツ2.0g・ブクリョウ2.0g)当帰芍薬散エキス(1/2量)1.650g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】

株式会社MORI PHARMACY  
東京都豊島区北大塚3-25-16  
伊納ビル2F  
問合せ先：0120-541-555  
(平日10時～19時)



【製造販売元】

劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931