

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

人参湯(顆粒)

(にんじんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている人参湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。 (5) 次の症状のある人。 : むくみ
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (6) 次の診断を受けた人。 : 高血圧、心臓病、腎臓病
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（下痢、嘔吐に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症：胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛。

[用法・用量]

下記の量を食前又は空腹時に水又は白湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回	7才未満 4才以上	1/2包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		4才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

- (2) 用法・用量を厳守すること。

〔成分・分量〕 [本品1日量3包 (1包1.4g) 中]

日本薬局方 ニンジン	1.5g	日本薬局方 ニンジン	0.75g
日本薬局方 カンゾウ	1.5g	日本薬局方 カンゾウ末	0.75g
日本薬局方 ピャクジュツ	1.5g	日本薬局方 ピャクジュツ末	0.75g
日本薬局方 カンキョウ	1.5g	日本薬局方 カンキョウ	0.75g
より製した水製乾燥エキス	1.2g		

〔保管及び取扱い上の注意〕


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。

- (3) 他の容器に入れ替えないこ。

- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。

- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



〔問い合わせ先〕

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号