


ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品 漢方薬 八味地黄丸(分包)「オオクサ」



使用上の注意

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	20丸(1包)	3回
7歳以上15歳未満	14丸(約2/3包)	
7歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関する注意＞小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

成人の1日服用量60丸(3包)中	
ジ オ ウ (地 黄)	1,600mg
サン シ ユ (山 茱 萸)	800mg
サン ヤ ク (山 薬)	800mg
タ ク シ ャ (沢 瀉)	600mg
ブ ク リ ョ ウ (茯 苓)	600mg
ボ タ ン ピ (牡 丹 皮)	600mg
ケ イ ヒ (桂 皮)	200mg
ブ シ 末 (附 子 末)	200mg

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



紙：箱、中仕切



シート：PE、金属

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元 株式会社シーディ 埼玉県草加市谷塚上町574-1

＜お客様相談室＞

電話：0120-19-9989 受付時間：10:00～18:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 大草薬品株式会社 神奈川県横須賀市森崎1-17-15

電話：046-834-1193 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

使用期限

製造番号



4 987031 005098