

トメラックEX

180錠
1回4錠

飲んで効く医薬品

ここからお切りください。

販売名：トメラックEX 第2類医薬品 180錠入

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと ①胃腸の弱い人。②下痢しやすい人。

☒相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	その他
症状	発疹・発赤 かゆみ	食欲不振 胃部不快感、腹痛	動悸、のぼせ 口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■**効能・効果** 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善
(肩こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ

■**用法・用量** 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠 ○○○○	3回
15歳未満	服用しないこと	

■**成分・分量** 1日量(12錠中)

(ケイヒ…0.5g・サンシュユ…1.5g・サンヤク…1.5g・ジオウ…2.5g・タクシャ…1.5g・ブクリョウ…1.5g・ブシ末…0.5g・ポタンピ…1.5g) 八味地黄丸料エキス(1/2量) 2.2g。添加物として、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含む。

■**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果に変わりはありません。
- 本剤は吸湿性が高いので、湿気により変色や亀裂など品質に影響を与える恐れがありますので次の点にご注意ください。服用のつどアルミ袋のチャックをよく閉めてご使用ください。ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【発売元】さくらフォレスト株式会社 福岡県福岡市中央区警固2丁目12-23

【製造販売元】至誠堂製薬株式会社 奈良県御所市茅原220-1

MADE IN JAPAN



さくらの森
相談窓口

☎0120-842-555

【月～金】9:00～18:00
【定休日】土・日・祝

使用期限

製造番号

版No.1