

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

51

錠剤 <sup>ぶく</sup> 茯 <sup>りょう</sup> 苓 <sup>いん</sup> 飲

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位（胃炎、胸やけに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：  
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時、温湯で服用する。

| 年 齢    | 1回量  | 1日服用回数 |
|--------|------|--------|
| 大人     | 4～6錠 | 3回     |
| 7～13才迄 | 2～3錠 |        |

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

| 自社製別紙規格 |         |      |    |        |      |   |
|---------|---------|------|----|--------|------|---|
| 日局      | ブクリョウ末  | 5.5g | 日局 | ブクリョウ  | 6.0g | 別水<br>紙性<br>工<br>規<br>キ<br>格<br>ス<br>2.5g |
| 日局      | ソウジュツ末  | 4.5g | 日局 | ソウジュツ  | 5.0g |   |
| 日局      | ショウキョウ末 | 3.5g | 日局 | ニンジン   | 4.0g |   |
| 日局      | ニンジン末   | 3.5g | 日局 | ショウキョウ | 4.0g |   |
| 別紙規格    | キシツ末    | 2.0g | 日局 | キシツ    | 2.5g |   |
| 局外生規    | チンピ末    | 3.5g | 日局 | チンピ    | 4.0g |   |

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

### 〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00（土，日，祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10