



SOKUYAKUウェルネス

第2類医薬品

煎漢生

防己黄耆湯

錠 SX

錠剤

180錠入

15日分

肥満症
多汗症
むくみに

水太りが気になる方の



有効成分
1日量(12錠)中
1,300mg
配合

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい方に

----- ◀ここからお切りください。-----



開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名: 防已黄耆湯錠SX

第2類医薬品 錠剤 180錠入 15日分

△【使用上の注意】

△ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりと息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身ののだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症: 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

【用法・用量】

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

1日量(12錠)中 防已黄耆湯エキス(1/2量)1300mg(ポウイ・オウギ各2.5g、ビャクジュツ・タイソウ各1.5g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.5gより抽出)

添加物: ステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかり閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【ご購入に関するお問い合わせ先】
 ジェイフロンティア株式会社
0120-770-328 (通話料無料)
 受付時間: 9:30~18:30
 (土日・祝日・年末年始を除く)



製造番号
使用期限

副作用被害救済制度
電話: 0120-149-931

【製造販売元】

ダンヘルスクエア株式会社
大阪市西区土佐堀1-4-11