

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

メグリル®錠

第2類医薬品

168錠

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	3 回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

〔成分・分量〕 12錠(3.6g)中

(オウギ2.5g・カンゾウ0.75g・ショウキョウ0.50g・タイソウ1.5g・ビャクジュツ1.5g・ボウイ2.5g)防己黄耆湯エキス(1/2量)2.0g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

〔発売元〕

株式会社MORI PHARMACY  
東京都豊島区北大塚3-25-16  
伊納ビル2F  
問合せ先：0120-541-555  
(平日10時～19時)



〔製造販売元〕 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号