

## 【販売名】EGライフ

EGライフは漢方処方「防風通聖散」を煎じて服用する  
不便をなくし、簡便に服用出来るようにエキス錠とした製品です。

【内容量】180錠

## ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

## ⚠ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 関係部位  | 症 状                                   |
|-------|---------------------------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ                             |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| 精神神経系 | めまい                                   |
| その他   | 発汗、動悸、むくみ、頭痛                          |

| 症状の名称            | 症 状  |
|------------------|--|
| 間質性肺炎            | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオノバチー | 手足のだるさ、しひれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害            | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腸間膜静脈硬化症         | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                                  |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘

4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】**体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

**【用法・用量】**次の量を1日3回食前または食間に服用すること。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大人(15歳以上) | 4錠      | 3回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと |        |

**【成分・分量】**12錠〔大人1日服用量〕中 防風通聖散エキス(1/2量) 2.50g

キキョウ・ビャクジツ・カンゾウ・オウゴン・セッコウ各1g、ダイオウ0.75g、トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシン・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g、ショウキョウ0.2g、カッセキ1.5g、ボウショウ0.75g より抽出。

添加物として、セルロース、炭酸Ca、酸化チタン、メタケイ酸アルミニウムMg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤飲の原因になったり品質が変わること。)

(4) 使用期限を過ぎたものは服用しないこと。(5) 本剤は吸湿しやすいため、服用後はチャックをしっかりと閉めること。

お問合せ先：漢方生薬研究所

フリーダイヤル 0120-852-489

(受付時間 10:00~17:00 平日のみ)

販 売 元 株式会社ハーバルアイ

福岡市中央区天神5-7-3 福岡天神北ビル6階

製造販売元 本草製薬株式会社

製造番号

使用期限

名古屋市天白区古川町125番地

