

**+** minacolor

ほちゅうえつきとうじょう

## ミナカラ 補中益気湯錠 (1日2回)

漢方製剤 第2類医薬品



## 元気がない、疲労、食欲不振に

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすい方

30日分 (240錠)

✂ ここからお切りください

◀ OPEN

開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

漢方製剤 【販売名】ミナカラ補中益気湯錠 (1日2回) 第2類医薬品 240錠 (30日分)

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**【効能・効果】** 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいもの次の諸症： 虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒  
**【用法・用量】** 次の量を1日2回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	4錠	2回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】** 1日量 (8錠) 中  
補中益気湯エキス (1/2量) ... 2370mg  
ニンジン ... 2.0g ヒヤクジュツ ... 2.0g  
オウギ ... 2.0g トウキ ... 1.5g  
タイソウ ... 1.0g サイコ ... 1.0g  
チンピ ... 1.0g カンゾウ ... 0.75g  
ショウマ ... 0.5g ショウキョウ ... 0.25g  
より抽出

添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナババロウを含む。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 本剤にぬれた手で触れないでください。(6) 手に取った錠剤を元の戻すこと、他の錠剤に影響を与えることがあるのでご注意ください。

**【製造販売元】** 大峰堂薬品工業株式会社  
奈良県大和高田市根成村574

**【発売元】** 株式会社ミナカラ  
<https://minacolor.com/>

### △ 使用上の注意

#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を経験したことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	胸段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位 (感冒に服用する場合には5~6日間) 服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



**薬剤師の  
アフターサポート**  
ミナカラでは、お薬について薬剤師に相談できます。



**商品の  
再購入**

〈お問合わせ〉ミナカラ お客様相談窓口

☎ 03-5544-8440

受付時間：10:00~17:00 (平日・月・金)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



PE, PET, M  
版 TP-1



4 571504 460059

製造番号  
使用期限