

この籍に記載の文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

漢方製剤 販売名

麻黄湯内服液H

第2類医薬品

30mL×3本

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人
(4) 発汗傾向の著しい人 (5) 高齢者 (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈効能・効果〉

体力充実して、かぜのひきはじめて、寒気がして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管炎、鼻づまり

〈用法・用量〉

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1瓶(30mL)	3回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

〈成分・分量〉

1日量3本(90mL)中に次の成分及び分量を含有しています。
麻黄湯エキス……………2.214mg

1日量マオウ5.0g、日局キョウニン5.0g、日局ケイヒ4.0g、
日局カンゾウ1.5g
上記生薬より製した軟エキス

添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、バニリン、エチルパニリン、グリセリンを含有します。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈その他〉

本品は、生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0748-52-1232 受付時間 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎1020-149-931

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

