



中国の民間説話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。

第2類医薬品

漢方製剤

マシニン®V 「コタロ-」

ましにんがんりょう
(麻子仁丸料エキス錠)

商品番号

S823

本剤は、漢方の古典「傷寒論」(後漢時代) 収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲
みやすく錠剤としたものです。

マシニンVは、潤下作用(腸を潤し、蠕動を促す)のある漢方便秘薬です。便が固めの常習
便秘に用いられます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強
が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者
に相談してください

下痢

4. 5~6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医
師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・湿疹・皮膚炎・
ふきでもの（にきび）・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量（本剤15錠中）

マシニン……3.333g キジツ………1.667g ダイオウ………2.917g
シャクヤク……1.667g コウボク………1.667g キョウニン………2.083g
より抽出した水製エキス2.333gを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、
ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、ヒプロメロース、メタケ
イ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有して
います。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠
剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が
変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのもので
すので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原
因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入
してください。



湿気注意

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106