

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

ホノミリキ<sup>®</sup>錠

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤・かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状   |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

| 年 齢        | 1 回量       | 1 日服用回数 |
|------------|------------|---------|
| 成人(15歳以上)  | 6錠         |         |
| 15歳未満 7歳以上 | 4錠         | 3回      |
| 7歳未満 5歳以上  | 3錠         |         |
| 5歳未満       | 服用しないでください |         |

〔用法・用量に関する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕 18錠(3.6g)中

(カンゾウ0.5g・ショウキョウ0.25g・タイソウ1.0g・チンピ1.0g・ニンジン2.0g・ハンゲ2.0g・ビャクジツ2.0g・ブクリョウ2.0g)六君子湯エキス(1/2量)1,200g

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミニウマグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 袋の中に乾燥剤を入れています。誤って服用しないよう注意してください。
- (5) 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

〔発売元〕

株式会社MORI PHARMACY  
東京都豊島区北大塚3-25-16  
伊納ビル2F



問合せ先: 0120-541-555  
(平日10時~19時)

〔製造販売元〕

創盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931