

第2類医薬品

ご使用に際してはこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい

◆角野の漢方製剤

角野薬師湯

角野の薬師湯は漢方処方に従って、生薬を配合して製した煎剤で、特異な芳香があります。

⚠(使用上の注意)



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人には服用しないこと

生後3ヶ月未満の乳児

長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる頭痛があらわれる。

- 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

めまい、ふらつきがあり、又は動悸があり、尿量が減少するものの次の諸症
神経質、ノイローゼ、めまい、動悸。息切れ、頭痛

用法・用量

大人（15才以上）は本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量ぐら
いまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて、1日に3回食前に
服用する。なお、小児用量は大人用量を1とするとき

15才未満7才以上 2/3

7才未満4才以上 1/2

服用に際して、次のことに注意すること

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1日量（1包） 15.0g

ブクリョウ	6.0g
ケイヒ	4.0g
ビャクジュツ	3.0g
カンゾウ	2.0g

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しいところに（密栓して）保管すること。
- 2) 小児の手の届かないところに保管すること。

お問い合わせ先

本製品に対するお問い合わせは、下記をお願いします。

有限会社 角野製薬所 Tel. 0994-58-7978

受付時間 月曜日を除く午後1時から6時まで

製造販売元 有限会社 角野製薬所

〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名5756

角野藥師湯

第2類医薬品

製造販売元

有限会社

角野製薬所

鹿児島県鹿屋市吾平町上名五七五六

電話（〇九九四）五八一七九七八

成分および分量または本質

1日量1包15g中	ブクリョウ	6.0g
	ケイヒ	4.0g
	ビャクジュツ	3.0g
	カンゾウ	2.0g

用法および用量

大人 1日1包, 1包に水約500ml (約2.75合)を加え
半量ぐらいまで煮つめ, せん液の滓をこして取り去り,
食前3回に分服する。

なお小児用量は大人用量を1とするとき

15才未満7才以上……………2/3

7才未満4才以上……………1/2

効能又は効果

めまい・ふらつきがあり, または動悸があり, 尿量が
減少するものの次の諸症
神経質・ノイローゼ・めまい・動悸・息切れ・頭痛

注意

- 1.服用に際しては, 説明文をよく読むこと。
- 2.直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。

10包 ¥3,150(税込) LOT

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931