

# 丹心<sup>®</sup>

第2類医薬品

- ◆ 細菌感染を起こして化膿すると、膿が溜まるだけでなく炎症も起こり、皮膚や歯肉、のどなどに痛みを引き起こすようになります。
- ◆ 丹心は、「排膿散及湯」という処方<sup>はいのうさんきやうとう</sup>を基本にした漢方薬で、6種類の生薬が排膿を促して炎症を鎮めることで、化膿性皮膚疾患や歯肉炎、扁桃炎といった炎症疾患に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意が必要があるので、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

注) 体力に関わらず、使用できます。

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注) 「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

## 成分・分量

本剤15錠(4.5g)中

カンゾウ……1.5 g	} 排膿散及湯エキス……2.7g
キキョウ……2.0 g	
キジツ……1.5 g	
シャクヤク……1.5 g	
ショウキョウ……0.50g	
タイソウ……1.5 g	

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有する。

- ・本剤は淡灰褐色で、特異なおいを有し、味は初め甘く後わずかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

丹心は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、丹心のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号