

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ナビゲート[®] 顆粒「分包」

ナビゲート顆粒「分包」は、漢方薬の抑肝散加芍薬黄連の水製乾燥エキスを配合した漢方製剤です。

体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、イライラのある方の、神経症、不眠症、更年期障害などによく効きます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸の弱い人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部重圧感 |
| その他 | 全身倦怠感、ふらつき |

- 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：

神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

<効能・効果に関連する注意>

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです

用法・用量

次の量を食間に服用してください

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包（2.0g） | 3回 |
| 4才以上15才未満 | 1/2包（1.0g） | |
| 1才以上4才未満 | 1/4包（0.5g） | |
| 1才未満 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分・分量

成人1日量（3包）中に次の成分を含んでいます

| 成分・含量 | |
|---|--------|
| 抑肝散加芍薬黄連水製乾燥エキス | 2700mg |
| 〔 ブクリョウ (3433.2mg) チョウトウコウ (792.0mg) 〕 | |
| 〔 カンゾウ (316.8mg) トウキ (2905.2mg) 〕 | |
| 〔 サイコ (1056.6mg) シャクヤク (2112.6mg) 〕 | |
| 〔 センキュウ (1426.2mg) オウレン (158.4mg) 〕 | |
| 〔 ソウジュツ (2799.0mg) 〕 | |
| 〔 より得たエキス 〕 | |

添加物として、乳糖、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、デンプン、グリコール酸Naを含有しています

<成分・分量に関連する注意>

本剤には生薬が配合されているので、製品により色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)本品は吸湿しやすい製剤ですので、1包を開封後は速やかに服用してください
また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください
- (5)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問合せ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発売元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3