

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

30

錠剤 ^{しん} 錠 ^{しゃ} 砂 ^{とう} 湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

貧血、めまい

〔用法・用量〕

食前1時間、又は食後に温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	10～15錠	3回
7～13歳迄	5～7錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

自社製別紙規格

日局	ボレイ末	1.69 g	日局	ボレイ	2.13 g	別水 紙性 規 格 ス 1.0 g
日局	ビャクシュツ末	1.69 g	日局	ビャクシュツ	2.13 g	
日局	ブクリョウ末	2.54 g	日局	ブクリョウ	3.19 g	
日局	ケイヒ末	1.69 g	日局	ケイヒ	2.13 g	
日局	カンソウ末	0.53 g	日局	ニンジン	2.13 g	
日局	還元鉄	0.01 g	日局	カンソウ	0.79 g	
日局	ニンジン末	0.85 g				

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3957-2997
○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社
東京都豊島区要町3-4-10