



**カップで簡単!**

# マヤドーの煎じ薬

## ネオ快気湯

【効能・効果】咳、気管支炎、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、喘鳴、痰、体質改善

① 熟湯150mLにティーバッグを入れ  
 ② かき混ぜながらしばらく待てば…  
 ③ 1回分の出来あがり!

\*ティーバッグは1日以内に3回使えます

和漢のチカラを科学し、あなたへ

茶剤・1袋

第②類医薬品  
HR249E-01



- ☑ 風邪のあと咳だけが残る
- ☑ 夜中になると咳で眠れない
- ☑ 長引く咳
- ☑ 体质からの改善に

この説明書きは本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。  
茶剤 ネオ快気湯 第②類医薬品 生薬製剤 20.0g×1袋

### 使用上の注意

- ☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬  
 ☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)体の虛弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:高熱、むくみ、食欲不振、吐き気・嘔吐、排尿困難(9)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	食欲不振・胃部不快感・吐き気・嘔吐
精神神経系	不眠、発汗過多、頭痛、動悸、全身倦怠感、精神興奮
泌尿器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。  
 症状の名称 症状  
 偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のだるさ、しづれ、つづり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】咳、気管支炎、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、喘鳴、痰、体質改善  
 【用法・用量】○通常成人1袋を3回、熟湯約150mLずつで振り出し、1日3回食前又は食間に服用してください。○成人1袋に水約600mLを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100mL、1日3回食前又は食間に温服することもできます。○8歳～15歳は成人の1/2量、4歳～7歳は成人の1/3量服用してください。

<用法・用量に関する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。  
 マオウ3.0g/ショウキョウ0.8g/シャクヤク1.4g/カンゾウ1.0g/ケイヒ1.4g/サイシン0.8g/ゴミン1.0g/ハング1.0g/キヨウニン1.0g/ブクホウク1.0g/コウボク1.2g/サイコ1.0g/オウゴン1.0g/タイソウ0.8g/キキョウ1.2g/オンジ1.2g/モッカ1.2g

<成分・分量に関する注意>本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元 ロート製薬グループ  
**摩耶堂製薬株式会社**  
 神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先:「くすりの相談室」電話(078)929-0112  
 受付時間:9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用期限

製造番号

HR249F-01