



和漢薬本来の効き目をあなたに  
摩耶堂の浸煎薬

# ネオ糖解湯

【効能・効果】糖尿病  
茶剤・1袋  
10種の生薬からなる  
日本生まれの和漢処方  
口渇、頻尿で  
血糖値が高めの方に

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

バクモンドウ	2.4g	カロコン	2.4g
ニンジン	1.6g	ブクリョウ	2.4g
カクコン	2.4g	ゴミシ	1.2g
ジオウ	2.4g	カンソウ	1.2g
チモ	2.0g	タラ根	2.0g

第2類医薬品

HR246A-03

この説明書は本剤と  
ともに保管し、服用の際  
にはよくお読みください。

茶剤 **ネオ糖解湯**

生薬製剤  
第2類医薬品  
20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 高齢者 (5) 次の症状のある人: むくみ、食欲不振、吐き気、嘔吐 (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
その他	興奮、不眠、高血圧

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオバギー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼれに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】糖尿病

【用法・用量】○通常成人1袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml・1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○通常成人1袋を3回・熱湯約150ml中にて振り出し、1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○小児(8歳~15歳)は成人の1/2量服用してください。

<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



4 987210 117031

製造販売元

ロート製薬グループ



**摩耶堂製薬株式会社**  
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先: 「くすりの相談室」電話(078)929-0112  
受付時間: 9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用  
期限  
製造  
番号

HR246B-03