

【生薬製剤】

# 強 風 弱 散

第3類医薬品

## \* 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位    | 症 状       |
|---------|-----------|
| ひ ぶ 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

下痢、胃腸カタル<sup>a)</sup>

a)胃腸カタル：胃腸炎のことを示します。

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢        | 1回量             | 1日服用回数 |
|------------|-----------------|--------|
| 大 人        | 1.5g(添付のサジ1杯)   | 3回     |
| 10歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0 g) |        |
| 5歳以上10歳未満  | 大人の1/2の量(0.75g) |        |
| 5歳未満       | 大人の1/3の量(0.5 g) |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

## 成分・分量

本剤4.5g中

ケイヒエキス……………2.178mL(固形物として0.145g)  
カンゾウ末……………0.691g  
ケイヒ末……………1.038g  
ビャクジュツ末……………0.691g  
ブクリョウ末……………0.691g  
ニンジン末……………0.691g  
カンキョウ末……………0.346g  
チンピ末……………0.207g

- ・本剤はだいたい褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

強風弱散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号