


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ちょう めい がん
長 命 丸
(生 薬 製 剤)

◆「長命丸」は血色悪く疲れ易い方又は手足が冷える方の下肢の痛み、腰痛、尿量の減少又は頻尿を改善するために、12種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

血色悪く疲れ易いもの又は手足が冷えるものの次の諸症
下肢の痛み、腰痛、尿量の減少又は頻尿。

用法・用量

食間にお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	20丸	3 回
7歳以上15歳以下	成人の1/2量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量	
4歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 4歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

成分・分量

本品1丸(0.15g)中、下記生薬を含有します。

ケイヒ末	6.13mg	タクシャ末	9.20mg
ブクリョウ末	9.20mg	ポタンピ末	9.20mg
シャゼンシ末	9.20mg	ジオウ末	24.54mg
ゴシツ末	12.27mg	ニクジュヨウ末	24.54mg
サンシュユ末	9.20mg	サンヤク末	9.20mg
ジンコウ末	6.13mg	カンキョウ末	6.13mg

添加物としてコメコを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7