



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ けん い か りゅう

# イスクラ健胃顆粒S

(生薬製剤)

## ■特徴

「イスクラ健胃顆粒S」は、トウジン、シュクシャなど8種類の植物性生薬から抽出したエキスを顆粒としたもので、比較的体力がなく、胃腸の働きの弱い方の胃炎、胃腸虚弱、胃痛、腹痛、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心、下痢の改善を目的としております。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状   |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

## ■効能・効果

比較的体力がなく、胃腸の働きの弱いものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃痛、腹痛、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心、下痢

## ■用法・用量

次の量を、1日2～3回、食前又は食間に服用してください。

| 年 齢       | 1回の服用量      | 1日の服用回数 |
|-----------|-------------|---------|
| 成人(15歳以上) | 1包          | 2～3回    |
| 15歳未満     | 服用しないでください。 |         |

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

## ■成分・分量

本品1日量3包(9.0g)中、下記成分及び分量の生薬より製した健胃軟エキスS11gを含有します。

|        |       |
|--------|-------|
| ビャクジュツ | 4.68g |
| ブクリョウ  | 4.68g |
| ハンゲ    | 2.34g |
| シュクシャ  | 1.80g |
| チンピ    | 1.80g |
| カンゾウ   | 1.62g |
| モッコウ   | 1.62g |
| トウジン   | 2.34g |

※添加物としてデキストリン、乳糖を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

URL : <http://www.iskra.co.jp/>