



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと:生後3ヶ月未満の乳児。



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。
- (5) 次の症状のある人。むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病



使用上の注意

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【効能・効果】腰痛、坐骨神経痛

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
10歳以上15歳未満	2/3包	
5歳以上10歳未満	1/2包	
5歳未満	1/3包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
- (4) 生後3ヶ月未満の乳児には服用させないこと。

【成分・分量】1日量3包(4.5g)中

ソウジュツエキス 0.723mL
(固体物として0.074g)

ソウジュツ 1.453g] エキス 1.675mL
カンキョウ 2.907g] (固体物として0.066g)

カンゾウ末 1.453g
ブクリョウ末 2.907g

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

【お問い合わせ先】

ルソイル【薬店名】真漢方堂
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

0120-531-866
(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【発売元】

株式会社エムズサイエンス
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

【製造販売元】

剤盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号