

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【生薬製剤】 ダイアベトン®カプセル

第2類医薬品

210カプセル

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 高齢者
 - 次の症状のある人
むくみ
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
 - 次の医薬品を服用している人
血糖降下剤

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

次の量を随時、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3~5カプセル	2~3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 15カプセル(3.0g)中

(カコン2g・カロコン1g・カンソウ1g・ゴミシ2g・ジオウ2g・バクモンドウ2g)水製エキス1g、カンソウ末1g、カロコン末1g

添加物として青色1号、黄色5号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】

株式会社MORI PHARMACY
東京都豊島区北大塚3-25-16
伊納ビル2F
問合せ先：0120-541-555
(平日10時~19時)



【製造販売元】 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

【効能・効果】 糖尿病、血糖増加による口渇

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931